



LACTIPLUS COATED®



Premiscela per tutte le specie, riservata esclusivamente alla produzione di alimenti per animali. Miscela di acidi organici microincapsulati per supportare la normale performance intestinale.

POLVERE
PRONTO ALL'USO

- Miscela di acidi organici microincapsulati utili per supportare la normale performance intestinale
- A rilascio graduale perché la digestione della capsula lipidica inizia nello stomaco e continua nell'intestino tenue.
- Acidi organici con isomeria ottica presenti in forma levogira per favorire la loro biodisponibilità.

CONTIENE

Acidi organici microincapsulati

Acido Lattico, Malico, Fumarico e Citrico

La forma L isomerica garantisce una migliore biodisponibilità degli acidi organici. Gli acidi organici supportano la funzionalità dell'apparato digerente, contribuendo alle prestazioni di crescita.

La combinazione di acidi con diversi valori di pK, con una differenza significativa nella digeribilità della proteina grezza e nella ritenzione di energia e azoto, aumenta le prestazioni di acidificazione.

E 270 Acido Lattico	Forma Levogira	125.000 mg
E 296 Acido DL-Malico	Levogiro e Destrogiro	75.000 mg
1a297 Acido Fumarico		150.000 mg
E 330 Acido Citrico		100.000 mg



Microcapsule Lipidi vegetali

La digestione delle capsule inizia nello stomaco e il suo rilascio prosegue nell'intestino tenue con un duplice effetto: condizionare il pH anche a livello dello stomaco e mantenere stabile l'ecosistema intestinale. Un corretto pH intestinale impedisce la proliferazione di microrganismi patogeni, che di solito si verifica a pH > 6,0-6,5.

Gli acidi rivestiti risultano meno corrosivi delle forme non rivestite e in genere funzionano a un pH molto più basso.



ISTRUZIONI PER L'USO

Specie	Quantità	Uso
Suini: Uso standard ⁽¹⁾	1,5-3 g/kg di mangime completo	Somministrare nei cambi di alimentazione e a seconda del momento produttivo e della gestione nutrizionale. Può essere utilizzato per lunghi periodi. ⁽¹⁾ in condizioni normali produttive e anche in associazione con premiscele medicate o additivi come acidificanti
Suinetti in svezzamento	1,5-3 g/kg di mangime completo	E' consigliata l'inclusione nel mangime per almeno 4 settimane post-svezzamento
Scrofe	1,5-3 g/kg di mangime completo	Dall'ultima settimana prima del parto fino al termine della lattazione.

Lactiplus Coated® nel controllo delle diarree di natura alimentare nei suini (Jia et al., Animal Nutrition Faculty - Sichuan Agricultural University, China, 2010)

L'uso di **Lactiplus Coated®** ha evidenziato anche il miglioramento del rapporto lattobacilli/coliformi, sia nell'intestino che nelle feci.



Variazione del pH gastrointestinale dei suinetti post-svezzamento

	pH gruppo controllo	pH gruppo Lactiplus Coated® 1kg/ton	pH gruppo Lactiplus Coated® 2kg/ton
Stomaco	5.17 ^A	3.56 ^B	3.31 ^{Bb}
Duodeno	5.72 ^A	4.79 ^{Ba}	4.63 ^{Bb}
Digiuno	6.25 ^A	5.66 ^B	5.57 ^B
Ileo	6.58 ^A	6.17 ^B	6.10 ^B

pH gastro-intestinale dei suinetti post-svezzamento a diverse concentrazioni



Packaging
Scatola con sacco da 25 kg

Luglio 2021

FAMIqs



Stabilimento Produttivo Certificato